

Από το προσωπικό αρχείο του Δρ. Κωτίδη

Οι καλοήθεις όγκοι του στομάχου (αδενώματα) συνήθως αφαιρούνται ενδοσκοπικά, χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες οι όγκοι αυτοί παίρνουν μεγάλες διαστάσεις ή έχουν πολύ ευρύ μίσχο οπότε είναι αδύνατη η ενδοσκοπική αφαίρεσή τους. Στις περιπτώσεις αυτές τη λύση δίνει η λαπαροσκοπική χειρουργική. Η ασθενής είχε ένα ευμέγεθες αδένωμα με μεταπλασία στο οπίσθιο τοίχωμα του στομάχου. Με ταυτόχρονη λαπαροσκόπηση και ενδοσκόπηση εντοπίστηκε η ακριβής θέση του όγκου. Ακολούθως έγινε γαστροτομή στο πρόσθιο τοίχωμα του στομάχου, αφαιρέθηκε ριζικά το αδένωμα και έγινε σύγκλιση του οπισθίου τοιχώματος με ραφές και του προσθίου τοιχώματος με τη χρήση κοπτορράπτη. Η γραμμή συρραφής ενισχύθηκε με επιπλέον ραφή. Η ασθενής κινητοποιήθηκε και σιτίστηκε την ίδια ημέρα και έλαβε εξιτήριο την επομένη.

Παρακολουθήστε το video της επέμβασης εδώ:

{youtube}oDMe_32jWxo{/youtube}